



Uso de antihistamínicos para las alergias

Los antihistamínicos pueden controlar las alergias. Pueden ayudar a controlar el asma en los niños con alergias que provocan síntomas de asma.

Los antihistamínicos se usan para tratar lo siguiente:

- Alergias (goteo nasal, estornudos, picazón y lagrimeo de los ojos)
- Urticaria (ronchas rojas en la piel)

Entre los antihistamínicos se incluyen:

Allegra, Benadryl, Claritin y Zyrtec.

Consulte con su médico sobre otras versiones menos costosas de estos antihistamínicos y si podrían ser adecuados para usted.

Los antihistamínicos se venden en comprimidos o en presentación líquida. Cómo se toman los antihistamínicos:

- Por vía oral



No use antihistamínicos para tratar un ataque de asma.

Posibles efectos secundarios frecuentes

- Dolor de cabeza
- Cansancio
- Somnolencia
- Sequedad en la boca

Posibles efectos secundarios poco frecuentes

- Urticaria (ronchas rojas en la piel)
- Más apetito
- Picazón
- Más sudoración que lo habitual

Llame a su médico o enfermera en los siguientes casos:

- Si los síntomas empeoran o no mejoran.
- Si tiene una reacción o un efecto adverso debido al medicamento.

No Se quede Sin Medicación

- Vigile la cantidad de dosis que queda en su medicamento.
- **Cuando haya usado aproximadamente la mitad de las dosis, llame para resurtir.**

**Si tiene preguntas o desea obtener recursos,
llame al 1 (833) 327-8462.**