




Cómo usar el inhalador RediHaler™

Siga estos pasos para usar correctamente el inhalador RediHaler

1. No es necesario agitar el inhalador RediHaler™.
2. Quite la tapa de la boquilla.
3. Exhale normalmente fuera del inhalador RediHaler™.
4. Coloque la boquilla en la boca, detrás de los dientes, y cierre los labios con fuerza alrededor de la boquilla.
5. Asegúrese de que la mano no cubra el conducto de ventilación en la parte superior del inhalador.
6. Mantenga el RediHaler™ en posición vertical y respire profundo.
7. Saque el inhalador RediHaler™ de la boca y aguante la respiración durante 10 segundos.
8. Gire la cabeza y exhale.
9. Ponga la tapa de nuevo en la boquilla. Debe hacer esto para asegurarse de que la próxima descarga salga correctamente.
10. Repita los pasos del 1 al 9 para cada inhalación o descarga que el médico le indique.
11. Cepíllese los dientes o enjuáguese la boca con agua después de usar el inhalador. No se trague el agua.



Instrucciones de limpieza


1. Quite la tapa del inhalador RediHaler™.
2. Use un pañuelo o paño limpio y seco para limpiar la boquilla.
3. Haga esto una vez a la semana.
4. **No** lave ni humedezca ninguna parte del RediHaler™.
5. Vuelva a poner la tapa después de limpiar la boquilla.

Mantenga el inhalador RediHaler en un lugar seco

- Mantenga la tapa puesta en el inhalador RediHaler™ en todo momento.
- No guarde el inhalador RediHaler™ en habitaciones que se calientan mucho.
- No deje que el inhalador RediHaler™ se humedezca. Guárdelo lejos de lugares húmedos.

Cuándo reemplazar el inhalador RediHaler

- Cuando el contador de dosis cambie a 20, los números se volverán rojos.
- **Cuando los números estén en rojo, ya es hora de volver a surtir el medicamento.**
- Deseche el RediHaler™ cuando el número cambie a cero.



**Si tiene preguntas o desea obtener recursos,
llame al 1 (833) 327-8462. www.SouthSideKidsAsthma.org**